

## 参考文献

- [1] 中华医学会外科学会胰腺学组. 急性胰腺炎的临床诊断及分级标准[J]. 中华外科杂志, 1997, 35(12): 773-775.
- [2] 廖家智. 美国急性胰腺炎临床指南(诊断部分)[J]. 临床内科杂志, 2007, 24(2): 136-139.
- [3] 陈灏珠. 实用内科学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2006: 969-1973.
- [4] Gloor B, Ahmed Z, Uhl W, et al. Pancreatic disease in the elderly[J]. Best Pract Res Clin Gastroenterol, 2002, 16(1): 159-170.

- [5] 徐世平, 马新, 吴本俨. 老年急性胰腺炎患者临床特征分析[J]. 中华老年医学杂志, 2003, 22(1): 12-14.
- [6] 中华医学会外科学会胰腺外科学组. 重症急性胰腺炎诊治原则草案[J]. 中华外科杂志, 2001, 39(12): 963-964.
- [7] Yousaf M, Mc Callion K, Diamond T. Management of severe acute pancreatitis[J]. Br J Surg, 2003, 90(4): 407-420.
- [8] 韩宏锋, 范银忠. 急性胰腺炎 64 例临床分析[J]. 中原医刊, 2006, 33(21): 5-6.

(收稿日期: 2007-11-02; 修回日期: 2008-02-02)

(本文编辑: 潘雪飞; 英文编辑: 王学文)

## · 个 案 ·

## 胆碱能性荨麻疹致晕厥 1 例

朱敏, 夏磊, 雷文婧

(解放军第 81 医院神经内科, 江苏南京 210002)

[关键词] 晕厥; 胆碱能性荨麻疹

中图分类号: R758.24 文献标识码: B 文章编号: 1672-271X(2008)03-0188-01

## 1 病案摘要

患者男, 57 岁, 于 2007 年 9 月 16 日 20:00 因突发晕厥 2 小时来我科住院治疗。既往有全身皮疹伴瘙痒病史 40 余年, 诊断为胆碱能性荨麻疹, 曾给予不规则抗过敏治疗, 具体用药不详。有高血压病史 10 余年, 血压波动在 140/100~110 mm Hg 之间, 长期服用心痛定 0.01 g, 3/日, 自诉血压控制良好。患者 2007 年 9 月 16 日晚 18:00 左右暴喝热水后出现全身皮疹, 伴瘙痒, 继而大汗, 感乏力, 无头痛, 头晕, 无发热, 无恶心、呕吐, 无肢体麻木、抽搐, 随即出现短暂意识丧失, 醒后发现坐倒在地, 后卧床休息; 约数分钟后患者再次出现上述症状, 并伴有小便失禁, 醒后至我院急诊, 查血常规: 白细胞  $7.2 \times 10^9/L$ , 中性粒细胞 0.68, 随机血糖 8.5 mmol/L。头颅 CT 未见异常度, 脉搏 80 次/分, 呼吸 18 次/分, 血压 135/85 mm Hg, 全身皮肤无黄染, 无皮疹及紫癜, 心、肺、腹部检查无异常。神经专科查体未见明显异常。入院后完善血、尿、粪常规、凝血常规、肝功能、肾功能均正常, 心电图、胸片、脑电图、头颅 MRI 及腹部彩超均未见异常。体外过敏原检测: 虾“+”, IgE“+”。诊断考虑: 1. 单纯性晕厥, 2. 胆碱能性荨麻疹, 3. 高血压病 2 级, 给予改善循环、抗过敏等对症治疗后, 患者未再有晕厥发作, 全身亦未再出现皮疹, 一般情况可。治疗 6 天后出院。

## 2 讨论

本例患者为中老年男性, 突然起病, 临床特点为突发晕厥, 具体表现为喝热水后全身皮疹、乏力、出汗, 继而短暂意识丧失, 后意识清楚, 不遗留后遗症, 反复发作两次。结合查

体和各项实验室检查, 排除癫痫、脑血管意外等其他相关疾病, 明确诊断为单纯性晕厥<sup>[1]</sup>。患者有 40 余年的胆碱能性荨麻疹病史, 分析原因为其所致的晕厥。胆碱能性荨麻疹, 又称小丘疹状荨麻疹或全身热性荨麻疹, 多见于青少年<sup>[2-3]</sup>, 由于运动、受热、情绪紧张、进食热饮或酒精饮料等使体内温度上升等诱发因素刺激中枢神经, 通过胆碱能传入神经刺激汗腺神经结合部, 引起乙酰胆碱释放作用于肥大细胞而发生<sup>[4]</sup>。因此当该患者摄入热水后, 增热的血流刺激大脑体温调节中枢, 兴奋胆碱能性神经并释放乙酰胆碱, 出现过敏反应后致全身皮疹并伴有乏力、出汗。其胆碱能纤维引起血管扩张、血管减压、低血压、脑血流下降、脑血管广泛供血不足致晕厥。因而, 有胆碱能性荨麻疹病史的患者, 要警惕晕厥的发生, 在今后的生活中, 要注意饮食、卫生, 避免不良刺激, 保持健康心态, 提高身体抵抗力。如有不适症状发生, 应尽快到医院诊治, 防止出现不良后果。

## 参考文献

- [1] 许玉韵, 杨进刚. 晕厥的诊断思路[J]. 心血管病学进展, 2006, 27(4): 392-394.
- [2] 廖八根, 熊锡. 胆碱能性荨麻疹 1 例报告[J]. 新医学, 2003, 34(10): 396.
- [3] 胡秀荣, 田晓晔. 采用海穴注射丹皮酚治疗胆碱能性荨麻疹 9 例[J]. 辽宁中医学院学报, 2006, 8(3): 87.
- [4] 刘辅仁. 实用皮肤科学[M]. 3 版. 北京: 人民卫生出版社, 2005: 438-439.

(收稿日期: 2008-04-02)

(本文编辑: 潘雪飞)