

[6] 孙建军, 马建芳, 王晨光, 等. 综合介入治疗原发性肝癌长期存活 34 例[J]. 东南国防医药, 2008, 10(6): 411-413.
 [7] 兰红艳, 孟兆雪. 综合治疗巨块型肝癌患者的护理[J]. 东南国防医药, 2008, 10(6): 452-453.
 [8] 宋均仿, 张海霞, 方少梅. 肝癌介入治疗 53 例护理[J]. 临床医学, 2010, 23(3): 28-29.
 [9] 韩倩. 舒适护理在肝癌介入治疗患者中的应用[J]. 齐鲁护

理杂志, 2010, 16(20): 64-66.
 [10] 乔羽. 舒适护理在术后心电图监护患者的应用[J]. 实用心电图学杂志, 2009, 18(2): 131-132.
 (收稿日期: 2013-02-18; 修回日期: 2013-04-22)
 (本文编辑: 黄攸生)

· 短 篇 ·

儿童意外损伤的危险因素分析

林红¹, 许宝珠², 林大东², 兰丽云²

[关键词] 儿童; 意外损伤; 危险因素; 分析
 [中图分类号] R720.597 [文献标志码] B
 doi:10.3969/j.issn.1672-271X.2013.04.033

本文总结分析 2000 年 5 月 - 2012 年 4 月我单位儿科、五官科、外科儿童意外损伤共 73 例, 现报告如下。

1 临床资料

73 例患儿中, 男 46 例, 女 27 例。从年龄阶段划分: 1 岁 4 例, 2~3 岁 14 例, 4~7 岁 29 例, 8~12 岁 21 例, 13~14 岁 5 例。受伤原因有: 玩耍时用利器或弹弓、玩具枪等伤眼共 25 例, 跌伤头、面部或伤及五官者 18 例, 鼠药中毒 5 例, 误服过量药品中毒 5 例, 误食野果、毒草 4 例, 药物中毒 5 例, 爆竹伤眼 2 例, 幼儿误吞异物 3 例, 食物中毒 2 例, 车祸 2 例, 溺水 1 例, 误服硫酸 1 例(该例 12 岁女童死亡)。

2 讨论

分析本组资料, 受意外损伤的儿童中, 男女比例约为 1.7:1, 说明男孩与女孩存在较明显的性格差异。男孩好动, 多喜欢参加跑、跳、打仗等较为激烈的游戏, 故男孩发生头、

面、眼、手足等处外伤较多, 而女孩则以误食野果、吞下异物、误服药者较多。从年龄上看 7 岁以下年龄受意外伤害的多, 说明该年龄儿童好奇、好动、但又年幼无知, 不能辨别自己的行为是否会危及自己或他人的安全, 也不能有效地保护自己, 故受伤的机会较多^[1-2]。在意外损伤中, 儿童玩耍时的自伤或外伤眼睛的很多, 说明儿童多半同一年龄或年龄差不多的一起玩耍, 由于身高、体重大致相当, 加之周围环境的影响, 儿童多喜模仿战争、打斗等游戏, 容易造成头面部及眼睛受伤。药物及化学品中毒也是主要的致伤因素。

意外损伤是一种突然发生的事件, 它是生活中对生命安全和健康有严重威胁的一种危险因素^[3]。作为幼教人员, 理应在预防儿童意外损伤方面发挥作用并传授有关知识, 大力宣传儿童保健工作的重要性。

【参考文献】

[1] 孙春阳, 武慧敏, 申杰, 等. 学龄前儿童意外伤害发生现状研究[J]. 中外健康文摘, 2010, 7(17): 132-133.
 [2] 梅萍萍, 陈晓荷. 儿童意外伤害原因分析及预防对策[J]. 卫生职业教育, 2010, 7(1): 129-130.
 [3] 王伟秀, 刘瑞庚, 彭义, 等. 唐山市某医院骨外伤儿童生活质量调查与分析[J]. 中国煤炭工业医学杂志, 2011, 14(6): 880-882.

(收稿日期: 2013-04-24)

(本文编辑: 潘雪飞)

作者单位: 1. 210002 江苏南京, 南京军区联勤部机关幼儿园保健室; 2. 362000 福建泉州, 解放军 180 医院

通讯作者: 许宝珠, E-mail: 1872243936@qq.com